

# Avertissements agricoles



Bulletin Technique n° 27 du 22 septembre 1989

Abonnement Annuel : 190 F

## \* COLZA :

- début d'activité des grosses altises confirmé
- flash sur les nouveaux anti-graminées de post-levée à action foliaire

## \* CEREALES A PAILLE :


- complément d'information sur les traitements de semences

## \*\* COLZA \*\*

### -----GROSSES ALTISES


\* **SITUATION** : les toutes premières captures de Grosses Altises ont été enregistrées les 19/20 septembre dans les cuvettes jaunes des postes d'observation du Sundgau (Altkirch et Aspach-le-Bas).

\* **PRECONISATION** : les conseils du bulletin précédent restent d'actualité.



**LA GROSSE ALTISE :**  
Petit coléoptère sauteur  
de 4 mm de long de  
couleur bleu-vert à  
reflets métalliques.

**SES DEGATS A LA  
LEVEE :**  
Fontes de semis ou  
morsures rondes au  
centre de cotylédons.



## \*\* CEREALES A PAILLE \*\*

### -----TRAITEMENT DES SEMENCES

#### \* Modification du message du bulletin n° 26 :

"Le flutriafol n'est plus formulé seul mais en association avec l'éthirimol, autre matière active efficace contre l'oïdium. Cette association est commercialisée en deux spécialités : FERRAX (Sopra) et GEOR (La Quinoléine)".

Imprimerie de la Station de STRASBOURG  
Directeur-Gérant : P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
D. R. A. F.  
Service Régional de la Protection des Végétaux

Cité Administrative  
67084 STRASBOURG CEDEX

Bas-Rhin : 88.69.65.89 - Haut-Rhin : 89.72.49.70

Publication périodique  
CPPAP n° 1848 AD



## LES NOUVEAUX ANTIGRAMINEES A ACTION FOLIAIRE DE POST-LEVEE SUR COLZA

Trois nouvelles spécialités complètent la gamme des Antigraminées :

### STRATOS,

de la société BASF, composé de cycloxydime (200 g/l), s'utilise à la dose de 1,25 l/ha + 3 l d'huile sur graminées annuelles et à la dose de 3 l/ha + 3 l d'huile sur graminées vivaces.

Autorisation provisoire de vente obtenue en Avril 1989.

Etudié à 1,5 l sans huile et à 1,25 l + 3 l d'huile au Service de la Protection des Végétaux, STRATOS pour une performance optimale doit être utilisé avec de l'huile pour augmenter son efficacité et sa vitesse d'action.

A la dose de 1,25 l + 3 l d'huile sur graminées annuelles et 3 l + 3 l d'huile sur graminées vivaces, il présente une très bonne efficacité sur Chiendent rampant, Pâturin commun, Repousses de Blé et d'Orge. Il est moyen sur Brome, Folle-avoine, Vulpin des champs.

### TARGA D+,

de la société PEPRO, composé de quizalofop-éthyl isomère D (120 g/l), s'utilise à la dose de 0,5 l/ha + 2 l d'huile sur graminées annuelles et à la dose de 1,25 l + 2 l d'huile sur graminées vivaces.

Homologation en Octobre 1988.

TARGA D+ présente des efficacités semblables à la dose de 1,25 l sans huile et 0,5 l + 2 l d'huile.

A la dose de 1,25 l sans huile

- très bonne efficacité sur Brome, Pâturin commun, Ray-grass, Repousses d'Orge, Vulpin des champs,
- bonne efficacité sur Pâturin annuel et Repousses de Blé,
- efficacité moyenne sur Chiendent rampant,
- insuffisance sur Folle-avoine.

### AGIL,

de la société LA QUINOLEINE, composé de propaquizafop (100 g/l), s'utilise à la dose de 1,2 l/ha sur graminées annuelles et 2 l sur graminées vivaces.

Autorisation provisoire de vente en Décembre 1988.

Au regard des résultats des 10 essais, AGIL présente :

- une très bonne efficacité sur Brome, Chiendent rampant, Ray-grass, Repousses de Céréales, Vulpin des champs,
- sur Folle-avoine, il contrôle les levées automnales mais décroche en cas de levées successives pendant l'hiver, il a une efficacité insuffisante en reprise de végétation.

Les vitesses d'action de STRATOS avec huile, TARGA D+ avec huile et AGIL sont comparables, elles sont supérieures à la référence FUSILADE X2.